# ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE



### DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 5:		(11) Numéro de publication internationale: WO 93/0180
A61K 9/16, 9/51	<b>A1</b>	(43) Date de publication internationale: 4 février 1993 (04.02.93
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/CE (22) Date de dépôt international: 15 juillet 1992		1000 Lausanne 9 (CH).
(30) Données relatives à la priorité: 2178/91-0 22 juillet 1991 (22.07.91)		(81) Etats désignés: BR, CH, CS, HU, KR, PL, RU.  Publiée  Avec rapport de recherche internationale.
(71) Déposant: DEBIO RECHERCHE PHARMACE S.A. [CH/CH]; 146, route du Levant, CH-1920 (CH).	Martig	ny .
(72) Inventeurs: HEIMGARTNER, Frédéric; 15, runettes, CH-1920 Martigny (CH). ORSOLINI, 1 rue de l'Hôpital, CH-1920 Martigny (CH).	ie des Piero ;	7;- 1,
·		

(54) Title: COMPOSITION FOR THE SUSTAINED AND CONTROLLED RELEASE OF A MEDICINAL PEPTIDE-CONTAINING SUBSTANCE, AND PREPARATION METHOD THEREFOR

(54) Titre: COMPOSITION POUR LA LIBERATION PROLONGEE ET CONTROLEE D'UNE SUBSTANCE MEDICA-MENTEUSE PEPTIDIQUE ET PROCEDE POUR SA PREPARATION

#### (57) Abstract

A composition for the sustained and controlled delivery of a medicinal peptide-containing substance having formula (I): Ac-D-Nal-D-pClPhe-R<sup>3</sup>-Ser-Tyr-D-Cit-Leu-Arg-Pro-D-Ala-NH<sub>2</sub>, in which R<sup>3</sup> is D-Pal or D-Top, is prepared. The composition is supplied in the form of microspheres made of a biodegradable polymer material incorporating a water-insoluble salt of said peptide of formula (I).

#### (57) Abrégé

On prépare une composition destinée à l'administration prolongée et contrôlée d'une substance médicamenteuse peptidique de formule(I): Ac-D-NaI-D-pClPhe-R³-Ser-Tyr-D-Cit-Leu-Arg-Pro-D-Ala-NH<sub>2</sub>, dans laquelle R³ désigne D-Pal ou D-Trp. La composition se présente sous forme de microsphères en matériau polymère biodégradable incorporant un sel insoluble dans l'eau dudit peptide de formule (I).

# UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	Fi	Finlande	MI.	Mali
AU	Australic	FR	France	MN	Mongolic
BB	Barbade	GA	Gabon	MR	Mauritanic
BE	Belgique	GB	Royaume-Uni	MW	Malawi
BF	Burkina Faso	GN	Guinée	NL	Pays-Bas.
RG	Bulgarie	GR	Grète	, NO	Norvège
BJ	Bčniu	HU	Hongric	PL	Pologne
BR	Brésil	1E	Irlande	RO	Roumanic
CA	Canada	iπ	Italic	RU	Fédération de Russie
CF	République Centraficaine	JР	Japan	SD	Soudan
œ	Congo	KP	République populaire démocratique	SE	Sučde
CH	Suisse	•	de Corée	SN	Sénégal
CI.	Côte d'Ivoire	KR	République de Corée	SU	Union soviétique
CM	Cameroun	ഥ	Liechtenstein	TD	Tchad
		LK	So Lanka	TG	Togo
CS	Tchécoslovaquie	LU	Luxembourg	US	Etats-Unis d'Amérique
DE	Allemagne		Munaco		
DK	Danemark	MC			
FC	Fengune	MG	Madagascar		

Composition pour la libération prolongée et contrôlée d'une substance médicamenteuse peptidique et procédé pour sa préparation

L'invention a pour objet une composition destinée à la libération prolongée et contrôlée d'une substance médicamenteuse peptidique de formule (I) :

Ac-D-Nal-D-pClPhe-R3-Ser-Tyr-D-Cit-Leu-Arg-Pro-D-Ala-NH2 (I)

dans laquelle R3 désigne P-Pal ou D-Trp.

De tels peptides sont des analogues du LHRH et peuvent être avantageusement utilisés dans le traitement thérapeutique de troubles hormono-dépendants. Dans la formule (I) ci-dessus, à moins qu'il en soit spécifié autrement, les acides aminés sont désignés de façon conventionnelle et possèdent la configuration L; D-Nal désigne D-3-(2-naphtyl) - alanine et D-Pal désigne D-3- (3-pyridyl) - alanine.

La composition selon l'invention se présente sous forme de microsphères en matériau polymère biodégradable incorporant un sel insoluble dans l'eau du peptide de formule (I). Une telle composition incorporant par exemple au moins 5% en poids de sel insoluble par rapport au poids de matériau polymère biodégradable, peut libérer le peptide de formule (I) de manière contrôlée durant plusieurs jours après son administration par voie parentérale à l'homme ou l'animal.

L'invention a également pour objet un procédé pour la préparation d'une composition telle que définie ci-dessus.

Il consiste à convertir premièrement un sel du peptide de formule (I) soluble dans l'eau en un sel de peptide insoluble dans l'eau, puis à mettre en suspension ledit sel de peptide en suspension dans une solution de matériau polymère biodégradable, à convertir ladite suspension en une émulsion de type huile-dans-eau et finalement isoler les microsphères de polymère biodégradable après transfert de l'émulsion huile-dans-eau dans un excès de milieu aqueux.

Diverses solutions ont été proposées à ce jour pour la préparation de compositions à libération prolongée et contrôlée de substances médicamenteuses, mettant en oeuvre d'implants biodégradables, fabrication microencapsulation ou la préparation de matrices poreuses biodégradables se présentant, par exemple, sous forme de microsphères ou microparticules de dimensions diverses. On peut citer à ce propos EP A 0.052.510 pour microencapsulation par séparation de phases de drogues hydrosolubles et EP A 0.058.481 ou US A 3.976.071 pour la préparation d'implants ou de matrices poreuses biodégradables à base de polylactide ou co-polylactideglycolide pour l'essentiel. Ces techniques font appel à la dissolution préalable dans un solvant organique du polymère ou copolymère biodégradable utilisé comme support, le cas échéant à la dissolution de la substance médicamenteuse elle-même.

D'autres techniques, conduisant également à la formation de microcapsules ou de microsphères, font appel à des procédés d'émulsification, la phase essentielle de tels procédés consistant à obtenir une émulsion de type huiledans-eau à partir d'une solution organique de matériau polymère et d'une solution aqueuse de peptide - voir à ce propos US-A-4.384.975, 3.891.570, 4.389.330, 3.737.337, 4.652.441 ou WO-90/13361 - Dans tous les cas de figure cependant, l'homme du métier est forcé de développer des techniques complexes et difficiles à maîtriser, afin de

réduire au mieux les pertes de substances actives peptidiques éminemment hydrosolubles, comme par exemple la double émulsification.

S'agissant de mettre en oeuvre, au cours d'un tel procédé, la formation d'une émulsion de type huile-dans-eau suivie de son transfert dans un milieu aqueux, le procédé de l'invention permet contre toute attente de surmonter avantageusement les défauts des techniques connues à ce jour.

En effet, en procédant premièrement à la conversion d'un sel peptidique hydrosoluble en un sel de peptide insoluble dans l'eau, l'invention offre à l'homme du métier un moyen particulièrement original de tirer parti des solubilités relatives des ingrédients mis en jeu, plus particulièrement des solvants et "non-solvants" mis en jeu.

Ledit procédé se caractérise par le fait que:

- a. on convertit un sel du peptide de formule (I) soluble dans l'eau en un sel de peptide insoluble dans l'eau.
- b. on met ledit sel de peptide insoluble dans l'eau en suspension dans un milieu organique contenant le matériau polymère biodégradable à l'état dissout;
- c. on disperse ladite suspension organique dans un milieu aqueux formant la phase continue de l'émulsion résultante;
- d. on transfère ladite émulsion dans un excès de milieu aqueux et finalement sépare de la phase liquide les microsphères ainsi obtenues.

La première phase du procédé consiste à convertir, au moyen des techniques usuelles, le sel de peptide soluble dans l'eau en un sel de peptide insoluble dans l'eau. Par "soluble dans l'eau", on entend un sel peptidique possédant une solubilité dans l'eau supérieure ou égale à 0,1 mg/ml à 25°C, de préférence supérieure ou égale à 1,0 mg/ml.

Par "insoluble dans l'eau" on entend un sel peptidique possédant une solubilité dans l'eau inférieure ou égale à 0,1 mg/ml à 25°C. Des sels de peptides tels le pamoate, le tannate, le stéarate ou le palmitate répondent à cette définition.

A titre de matériau polymère biodégradable, on utilise un polylactide, un polyglycolide, un copolymère d'acides lactique et glycolique.

A titre de matériau polymère préférentiel, il convient de citer les copolymères d'acides lactique et glycolique (PLGA), en particulier les copolymères d'acide L- ou D, L-lactique contenant de 45 à 90% (mole %) de motifs acide lactique, respectivement de 55 à 10% (mole %) de motifs acide glycolique.

A titre de solvant du matériau polymère choisi, on utilise un solvant organique tel le chlorure de méthylène par exemple, dans tous les cas un solvant se comportant comme un "non-solvant" pour le sel de peptide retenu.

Selon l'invention, une fois ledit sel mis en suspension dans la solution organique de matériau polymère, celle-ci est incorporée à une quantité prédéterminée d'un milieu aqueux, le plus généralement de l'eau additionnée d'un agent tensio-actif approprié. Le but visé est la formation rapide d'une émulsion homogène, de type huile-dans-eau, ledit milieu aqueux faisant office de phase continue. Divers facteurs interviennent dans la préparation d'une telle émulsion, qui à leur tour conditionnent la taille ou la structure des microsphères résultant du processus. L'un des facteurs à prendre en considération est la vitesse d'addition de la solution organique au milieu aqueux; un autre peut être la température ou encore la vitesse d'agitation ou l'énergie de dispersion (sonication), ce dernier paramètre influant notamment sur la taille des microsphères finales. Il est du ressort de l'homme du métier mettre en oeuvre les méthodes et conditions d'émulsification appropriées au but visé.

En cours de réalisation de la dite émulsion, il peut être également avantageux de modifier le rapport volumique des phases en présence, notamment de diminuer le volume initial de la phase organique par rapport à celui de la phase aqueuse. Selon les cas, vu la volatilité des solvants organiques mis en jeu, le chlorure de méthylène par exemple, une évaporation intervenant spontanément lors de l'agitation peut déjà se révéler suffisante; dans d'autres, l'on peut accélérer le phénomène souhaité en pratiquant une évaporation partielle, sous pression réduite.

Une fois l'émulsion organique-aqueuse stabilisée, celleci est transférée dans une quantité excédentaire de milieu aqueux, le plus généralement de l'eau. Une telle opération vise à amplifier le durcissement des microsphères embryonnaires formées dans l'émulsion, par extraction du solvant organique encore présent dans lesdites microsphères. Cette opération vise également à éliminer simultanément les traces encore présentes d'agent tensio-actif qui pourraient subsister dans la masse de polymère en cours de durcissement terminal. On notera que l'eau est un "non-solvant" aussi bien pour le matériau polymère biodégradable, tel le PLGA par exemple, que pour le sel de peptide présent au sein des dites microsphères. Cette situation favorise d'autant l'extraction nécessaire de solvant résiduel du polymère, CH2Cl2 par exemple.

Après transfert de ladite émulsion dans un excès de milieu aqueux, on recueille les microsphères durcies conformément aux techniques usuelles, par exemple la centrifugation, la filtration ou la décantation. Lavages, purifications et séchages s'effectuent de même.

L'un des avantages du procédé de l'invention est qu'il permet l'obtention de microsphères dont la taille peut être contrôlée avec précision, ce contrôle s'opérant essentiellement lors de la préparation de l'émulsion (vitesse d'agitation par exemple). Un autre avantage tient au taux de charge peptidique particulièrement élevé que l'on

peut obtenir, 5, 10 voire 20% poids ou plus selon les cas. En outre, le rendement de l'incorporation du peptide ou sel de peptide est particulièrement élevé; ceci est notamment dû à la conversion préalable du sel peptidique hydrosoluble en sel insoluble dans l'eau.

Les microsphères obtenues conformément au procédé de l'invention à partir des ingrédients susmentionnés sont alors utilisées, après une stérilisation adéquate, pour la préparation de suspensions destinées à une administration par voie parentérale, par exemple une injection intramusculaire ou sous-cutanée.

L'invention est illustrée au moyen des exemples ciaprès. De tels exemples ne sont en aucun cas limitatifs.

#### Exemple 1

3 g d'acétate de l'analogue de LHRH de formule

Ac-D-Nal-D-pCl-Phe-D-Pal-Ser-Tyr-D-Cit-Leu-Arg-Pro-D-Ala-NH<sub>2</sub> ont été convertis en pamoate correspondant selon les techniques usuelles et traités de façon à obtenir des particules de dimension moyenne d'environ 10 microns.

0,317 g du dit pamoate et 1,683 g de PLGA 75:25 (mole %) ont été mis en suspension dans 20 ml de CH<sub>2</sub>CL<sub>2</sub>, puis ladite suspension ajoutée à 20 ml de CH<sub>2</sub>CL<sub>2</sub> contenant à l'état dissout 1,683 g de copolymère d'acides D,L-lactique et glycolique (PLGA) 75:25 (mole % / viscosité inhérente 0,82 dans HFIP). Le mélange a été effectué à température ambiante, sous agitation, de sorte à obtenir une suspension parfaitement homogène.

La suspension résultante a ensuite été déchargée en une seule fois dans 500 ml de solution de méthoxycellulose à 0,075% dans l'eau et l'agitation du mélange poursuivie durant environ. 90 min à température ambiante (vitesse d'agitation 900 tours/min). L'évolution de l'émulsion est

suivie périodiquement, en moyenne toutes les 30 minutes, par prélèvement d'un échantillon et examen des microsphères présentes au microscope.

Une fois l'agitation terminée (stabilisation de la réduction de taille des microsphères), ladite émulsion est transférée en une seule fois dans 2 l d'eau maintenue à environ. 10°C, le mélange étant agité jusqu'à son homogénéisation.

Les microsphères de PLGA ont été isolées du mélange réactionnel et purifiées par une succession de centrifugations alternant avec lavage avec  $\rm H_2O$ , et finalement filtrées et séchées sous pression réduite. On a ainsi recueilli 1,61 g (rdt 80%) de microsphères de PLGA comportant plus de 94% de particules de diamètre inférieur à 100 microns (max. à 55-85 microns).

Après analyse (dissolution de la masse de PLGA, extraction et détermination du peptide par HPLC), on constate que le taux de charge des microsphères en pamoate est de 9,05% poids (théorique: 10%).

Les microsphères ainsi obtenues ont ensuite été soumises à une stérilisation par rayons gamma et mises en suspension dans un véhicule stérile approprié. Les tests in vivo (dosage du taux de testostérone sanguin chez des rats mâles) confirment la libération régulière de la substance active.

#### Exemple 2

On a procédé exactement comme indiqué à l'Exemple 1, en utilisant 0,634 g du pamoate d'analogue de LHRH pour 1,366 g de PLGA 75:25.

Microsphères de PLGA: 1,70 g (rdt 85%).

Taux de charge: 18,3% (théorique: 20%).

Les microsphères ainsi obtenues ont ensuite été soumises à une stérilisation par rayons gamma et mises en suspension dans un véhicule stérile approprié. Les tests in vivo (dosage du taux de l'analogue dans le sérum sanguin chez les rats mâles) confirment la libération régulière d'une quantité biologiquement significative de substance active sur au moins 24 jours.

· DUREE (jours)	DOSAGE DU PEPTIDE (ng/ml)
0 + 3 heures 1 2 3 6 8 10 14	47,1 48,9 52,2 46,9 50,4 40,1 42,1 29,8
16 20 . 24	33,5 33,0 25,6

Ces résultats sont aussi confirmés par les analyses faites sur des sujets sacrifiés à J30 : perte de poids des testicules d'au moins 80%, pertes de poids des vésicules séminales d'au moins 90%.

- 9 -

#### Exemple 3

On a répété le procédé de l'Exemple 1, utilisant 3 g d'acétate de l'analogue de LHRH de formule

Ac-D-Nal-D-pCl-Phe-D-Trp-Ser-Tyr-D-Cit-Leu-Arg-Pro-D-Ala-NH2

Après conversion du dit acétate en pamoate correspondant et traitements subséquents tels que décrits à l'Exemple 1, on a obtenu des microsphères en matériau polymère présentant les mêmes caractéristiques que précédemment.

## REVENDICATIONS

1.- Composition destinée à la libération prolongée et contrôlée d'une substance médicamenteuse peptidique de formule (I) :

Ac-D-Nal-D-pClPhe-R3-Ser-Tyr-D-Cit-Leu-Arg-Pro-D-Ala-NH2

dans laquelle R<sup>3</sup> désigne D-Pal ou D-Trp, caractérisée en ce qu'elle se présente sous forme de microsphères en matériau polymère biodégradable incorporant un sel insoluble dans l'eau du peptide de formule (I).

- 2.- Composition selon revendication 1, caractérisée en ce que le sel peptidique insoluble dans l'eau est un pamoate, tannate, stéarate ou palmitate.
- 3.- Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le matériau polymère biodégradable est un polylactide, un polyglycolide ou un copolymère d'acides lactique et glycolique.
- 4.- Composition selon la revendication 3, caractérisée en ce que le copolymère d'acides lactique et glycolique est un copolymère d'acide L- ou D, L- lactique contenant de 45 à 90% (mole) de motifs acide lactique, respectivement de 55 à 10% (mole) de motifs acide glycolique.
- 5.- Composition selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'elle se présente sous forme de microsphères de copolymère d'acides lactique et glycolique 75:25 (rapport molaire) incorporant au moins 5% en poids de pamoate d'un peptide de formule (I).

- 6.- Utilisation d'une composition selon l'une des revendications 1 à 5 pour la préparation d'une suspension destinée à une administration par voie parentérale.
- 7.- Procédé pour la préparation d'une composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que
  - a) on convertit un sel du peptide de formule (I) soluble dans l'eau en un sel de peptide insoluble dans l'eau;
  - b) on met en suspension ledit peptide, respectivement sel de peptide insoluble dans l'eau en suspension dans un milieu organique contenant le matériau polymère biodégradable à l'état dissout;
  - c) on disperse ladite suspension organique dans un milieu aqueux formant la phase continue de l'émulsion résultante;
  - d) on transfère ladite émulsion dans un excès de milieu aqueux et finalement sépare de la phase liquide les microsphères ainsi obtenues.
- 8.- Procédé selon la revendication 7 caractérisée en ce qu'avant de transférer l'émulsion huile-dans-eau dans un excès de milieu aqueux, on procède à une évaporation partielle du solvant organique constituant la phase huile.
- 9.- Un procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce que le sel de peptide insoluble dans l'eau est un pamoate, tannate, stéarate ou palmitate.
- 10.- Un procédé selon l'une des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que le matériau polymère biodégradable est un polylactide, un polyglycolide ou un copolymère d'acides lactique et glycolique.

11.- Un procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que le copolymère d'acide L- ou D, L- lactique contenant de 45 à 90% (mole) de motifs acide lactique, respectivement de 55 à 10% (mole) de motifs acide glycolique.

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

.PCT/CH 92/00146

		1 PUL/UN 92/	VV 140
A. CL	ASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC According	5 A61K9/16; A61K9/51 to International Patent Classification (IPC) or to bot	h national classification and IPC	· 
B. FIE	LDS SEARCHED		
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed l	by classification symbols)	•
IPC	5 A61K; C07K		
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included in t	he fields searched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, search	terms used)
		•	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	· .	
Category*	Citation of document, with indication, where a	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	PROC. NATL. ACAD. SCI. USA Vol. 88, No. 3, February 1991 USA	, NEW-ORLEANS	1-3
	pages 844-848 KORKUT E. ET AL "INHIBITION O EXPERIMENTAL PROSTATE CANCER   DELIVERY SYSTEMS (MICROCAPSUL MICROGRANULES) OF THE LUTEINI HORMONE ANTOGONIST SB-75"	WITH SUSTAINED ES AND	•
. У	see page 845 "Materials and M	ethods"	4-6
X	FR,A,2 649 319 (SANDOZ SA) 11 January 1991		7–11
Y	see page 6, paragraph 5 - page see page 12, paragraph 5 - page see page 22, paragraph 3 - page see page 33 - page 35; example	ge 13, paragraph 2 ge 23, paragraph 2	4,6
		-/	
Furthe	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
'A" docume	rategories of cited documents: It defining the general state of the art which is not considered particular relevance	the principle of theory underlying the	cation but cited to understand invention
"L" document cited to	ocument but published on or after the international filing date at which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered step when the document is taken along	ered to involve an inventive
	eason (as specified) It referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	compatted with one of more outer 2000 (	step when the document is documents, such combination
	t published prior to the international filing date but later than ty date claimed	being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same patent	1
Date of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international sear	rch report
26,0	ctober 1992 (26.10.92)	09 November 1992 (09.1	1.92)
Name and m	ailing address of the ISA/	Authorized officer	
EURO acsimile No	PEAN PATENT OFFICE	Telephone No.	

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CH 92/00146

tegory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
-8-5		
Y	DE,A,4 023 134 (DEBIOPHARM S.A.) 31 January 1991 see page 3, line 20 - line 53 see page 3 - page 4; example 1	5
X	FR,A,2 491 351 (STOLLE RESEARCH & DEVELOPMENTS CORP.) 9 April 1982 cited in the application & US-A-4389330 see page 2, line 21 - page 3, line 10 see page 10, line 21 - line 31 see page 10 - page 12; example 1	7,8
A	FR,A,2 620 621 (BPD BIOPHARM DEVELOPMENTS LTD) 24 March 1989 see page 3, line 13 - line 24 see page 4 - page 6; examples 1,2,6 see claims	7-11
A	INT. J. PEPTIDE RES. Vol. 35, No. 6, 1990, NEW-ORLEANS USA pages 557 - 565 CSERNUS V.J. ET AL "RELEASE OF PEPTIDES FROM SUSTAINED DELIVERY SYSTEMS (MICROCAPSULES AND MICROPARTICLES) IN VIVO" see page 558 "MATERIALS AND METHODS"	1 .
A	THE JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY Vol. 37, No. 6, 20 december 1990, pages 1061-1067 SCHALLY A.V. ET AL "ANTITUMOR EFFECT OF ANALOGS OF LHRH AND SOMATOSTATIN: EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES" see page 1061 "Summary" see paragraph 2 see page 1062, column 2, paragraph 3 - page 1063, column 1, paragraph 1	1

# ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

CH 9200146 62335 SA

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 12/10/92.

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the surpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date		tent family nember(s)	Publication date
R-A-2649319	11-01-91	AU-A-	5874690	10-01-91
K-V-5043313	11-01.31	CA-A-	2020477	08-01-91
		DE-A-	4021517	17-01-91
	. •	GB-A-	2234896	20-02-91
•	•	JP-A-	3068511	25-03-91
		LU-A-	87764	11-03-92
		NL-A-	9001537	01-02-91
	31-01-91	CH-A-	679207	15-01-92
E-A-4023134	31 01 31	AU-B-	619996	06-02-92
		AU-A-	5910390	31-01-91
		CA-A-	2021767	29-01-91
		FR-A-	2650182	01-02-91
		GB-A-	2234169	30-01-91
		JP-A-	3066625	22-03-91
		LU-A-	87772	11-12-90
•	•	NL-A-	9001646	18-02-91
		US-A-	5134122	28-07-92
	09-04-82	US-A-	4389330	21-06-83
R-A-2491351	03 04 02	AT-B-	384557	10-12-87
		AU-B-	543059	28-03-85
		AU-A-	7594281	22-04-82
	•	BE-A-	890638	05-04-82
		CA-A-	1142810	15-03-83
	•	CH-A-	648494	29-03-85
		DE-A-	3136606	16-06-82
		GB-A,B	2088314	09-06-82
	,	JP-C-	1489865	07-04-89
		JP-A-	57093912	11-06-82
		JP-B-	63036290	19-07-88
		NL-A-	8104507	03-05-82
		SE-B-	453798	07-03-88
	•	SE-A-	8105897	07-04-82
R-A-2620621	24-03-89	GB-A-	2209937	01-06-89
.⊻_∀_5050051	L	AU-A-	2232688	23-03-89
		BE-A-	1001685	06-02-90
		CH-A-	675968	30-11 <b>-9</b> 0
		DE-A-	3822459	30-03-89
				•
	•			,
•				,
	•			

# ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

CH 9200146 62335

This agreet lists the patent family members relating to the patent documents cited in the abeve-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 12/10/92.

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Pat	ent family ember(s)	Publication date
FR-A-2620621		JP-A- LU-A- NL-A- SE-A-	1121222 87340 8802323 8803321	12-05-89 06-04-89 17-04-89 22-03-89
		,		
·				
		· .		
	-			
-				
•				
				·
				,
	•			
•				
				•
	•			
•				

Describe interestionals No

w., .		La Company Company		
			cation sent applicables, les indiquer tous) ?	
Selon in ci	lassification internation	sale des brevets (CIB) on à la fois selon	la dessification nationale et la CIB	•
	5 A61K9/16			
		•		•
7.00.61	Part Care t man come	C I A DECREDOUE A DOUTE		
IL DOMA	NES SUR LESQUEL	S LA-RECHERCHE A-PORTE	on minimale consultée <sup>8</sup>	
		Document		
Système	e de classification		Symboles de classification	
			•	
CIB	5	A61K; C07K	•	•
			to be a section of the land of	
	• •	Documentation consulter autre que	e la documentation minimale dans la mesure 5 domaines sur lesqueis la recherche a porté	
			•	
		•	•	
				·
III. DOCT	MENTS CONSIDERE	S COMME PERTINENTS ID		,
		elfication des documents cités. SVEC I	ndication, si nécessaire/2	No. des revendications
Catégorie °		des persages pertinen	15 13	visées 14
	2222	ACAD CCT 1164		1-3
X	PROC. N	ATL. ACAD. SCI. USA	NEW_ODI FANS	
		, no. 3, Février 1991	, MEM-OKLEANS	
	USA	44 040		
	pages 8	44 - 848 E. ET AL 'INHIBITION	חב כפחשדוו חב	
·	KORKUI	F. F. VE INHIBITION	UTTU	
	EXPERIM	ENTAL PROSTATE CANCER	MILLIOUCEDCIII EC	
	SUSTATIN	ED DELIVERY SYSTEMS (	TETUTTING	
	AND MICH	ROGRANULES) OF THE LU- RELEASING HORMONE AN	ITACONIST	
		-KELEASING HOKMONE AN	INGORISI	
	SB-75'	- Off Whaterials and	l Mathadell	4-6
Y	voir pag	ge 845 "Materials and	I Hethous	
.		-40 210 (CANDO7 SA)	•	7-11
X		649 319 (SANDOZ SA)		′ ••
	11 Janv	ier 1991	7 slinés 3	4,6
Y	voir pag	ge 6, alinéa 5 - page	: /, alinea 3	*,*
-	voir pag	ge 12, aliméa 5 - pag	je 13, ajinea 2	•
	voir pag	ge 22, alinéa 3 - pag	18 23, diffica 2	
	voir pag	ge 33 - page 35; ехеп	pies 0,9,10	
			-/	
			-/	
		<del></del>		4.3 to dean do divido
· · · · Catégo	cies spéciales de docum	eests citis: <sup>11</sup>	document ultérieur publié postérieuremen international ou à la date de priorité et u	'appartenenant pas
_ "A" doc	ument définissant l'éta	t général de la technique, non	N'état de la technique pertinent, mais ci le principe ou la théorie constituant la le	te ann consoredure 1
	siderè comme particuli	publié à la date de dépôt interna-	The document porticellibration partiagnt: Fire	vention revendi-
The state of the s	raj on spret cette exte	The second secon	no next être considéré comme boll	relie nu cumuné .
doe	vaniant arangest fetat til	doute sur une revendication de niner in date de publication d'une	impliquent une activité inventive	vention reven-
200	re citation on pour une	raison spéciale (telle qu'indiquée)	document particulièrement pertinent; l'in diquée ne peut être considérée comme in	DIMITIZATI GILS
-"O" doc		e divelgation orale, 🛦 un usage, å	activité inventive lorsque le document est plusieurs autres documents de même nati	re, cette combi-
"P" doc	ument publié avant la :	inte de dépôt international, mais	naison étant évidente pour une personne	do mático.
postériouren	ent à la date de priori	ié revendiquée	"A" document qui fait partie de la même fam	ne sa meren
IV. CERTI	FICATION '			
		ationale a été effectivement achevée.	Date d'expédition du présent rapport de re	cherche internationale
THE E IN			0 9. 11. 92	
	26 OCTO	RE 1992	0 0. 11. 82	
	<u></u>	A framella de	Signature du fonctionnaire autorist	
Administrati	on chargée de la reche		POINTE D	sularis
	OFFICE E	UROPEEN DES BREVETS	BOULOIS D.	
			0	

	NTS CONSIDERES COMME PERTINENTS <sup>14</sup> (SUITE DES RENSEIGNES DEUXIEME FEUILLE)	MENTS INDIQUES SUR LA
Catégorie °	Hentification des documents citis, <sup>15</sup> avec indication, si nécessaire des passages partinents <sup>17</sup>	No. des revendications visões <sup>18</sup>
Y	DE,A,4 023 134 (DEBIOPHARM S.A.) 31 Janvier 1991 voir page 3, ligne 20 - ligne 53 voir page 3 - page 4; exemple 1	5
X	FR,A,2 491 351 (STOLLE RESEARCH & DEVELOPMENTS CORP.) 9 Avril 1982 cité dans la demande & US-A-4389330 voir page 2, ligne 21 - page 3, ligne 10 voir page 10, ligne 21 - ligne 31 voir page 10 - page 12; exemple 1	7,8
A	FR,A,2 620 621 (BPD BIOPHARM DEVELOPMENTS LTD) 24 Mars 1989 voir page 3, ligne 13 - ligne 24 voir page 4 - page 6; exemples 1,2,6 voir revendications	7-11
A	INT. J. PEPTIDE RES. vol. 35, no. 6, 1990, NEW-ORLEANS USA pages 557 - 565 CSERNUS V.J. ET AL 'RELEASE OF PEPTIDES FROM SUSTAINED DELIVERY SYSTEMS (MICROCAPSULES AND MICROPARTICLES) IN VIVO' VOIR PAGE 558 "MATERIALS AND METHODS"	•
A	THE JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY vol. 37, no. 6, 20 Décembre 1990, pages 1061 - 1067 SCHALLY A.V. ET AL 'ANTITUMOR EFFECT OF ANALOGS OF LHRH AND SOMATOSTATIN: EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES' voir page 1061 "Summary" voir alinéa 2 voir page 1062, colonne 2, alinéa 3 - page 1063, colonne 1, alinéa 1	1

# ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE RELATIF A LA DEMANDE INTERNATIONALE NO.

9200146 SA 62335

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche internationale visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets. 26/10/92

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication		lembre(s) de la iille de brevet(s)		late de blication
FR-A-2649319	11-01-91	AU-A-	5874690	10-01-9	
TR A LOISOLS		CA-A-	2020477	08-01-9	l
		DE-A-	4021517	17-01-93	1
		GB-A-	2234896	20-02-93	l
		JP-A-	3068511	25-03-9	
	•	LU-A-	87764	11-03-9	
	•			01-02-9	
	no = 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	NL-A-	9001537	01-02-3.	
DE-A-4023134	31-01-91	CH-A-	679207	15-01-92	
<b>DE 102010</b> .		AU-B-	619996	06-02-92	
		AU-A-	5910390	31-01-93	
		CA-A-	2021767	29-01-93	
•	•	FR-A-	2650182	01-02-9	
				30-01-9	
		GB-A-	2234169		
		JP-A-	3066625	22-03-93	
		LU-A-	87772	11-12-90	
	•	NL-A-	9001646	18-02-9:	
		US-A-	5134122	28-07-92	2
FR-A-2491351	09-04-82	US-A-	4389330	21-06-83	3
FK-4-5431331	03-04-02	AT-B-	384557	10-12-87	
-		AU-B-	543059	28-03-8	
			7594281	22-04-82	
		AU-A-			
		BE-A-	890638	05-04-82	
		CA-A-	1142810	15-03-83	
		CH-A-	648494	29-03-8	
		DE-A-	3136606	16-06-82	2
		GB-A,B	2088314	09-06-8	2
•		JP-C-	1489865	07-04-89	
		JP-A-	57093912	11-06-82	
				19-07-88	
-		JP-B-	63036290		
		NL-A-	8104507	03-05-82	
		SE-B-	453798	07-03-88	
		SE-A-	8105897	07-04-8	<u></u>
FR-A-2620621	24-03-89	GB-A-	2209937	01-06-89	3
IN A LULVULI	~ ~ ~ ~	AU-A-	2232688	23-03-89	)
		BE-A-	1001685	06-02-90	
			675968	30-11-90	
		CH-A-			
		DE-A-	3822459	30-03-89	,
				,	

EPO FORM POGT2

# ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE CH RELATIF A LA DEMANDE INTERNATIONALE NO.

9200146 62335

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche internationale visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets. 26/10/92

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	M	embre(s) de la ille de brevet(s)		Date d	e 011
FR-A-2620621	1	JP-A- LU-A- NL-A- SE-A-	1121222 87340 8802323 8803321	00	2-05-89 5-04-89 7-04-89 2-03-89	•
		,			*	
·	. 8					
		,				
	•					
•					~	
				,		
	<b>.</b> .					
						-
			·			•